

SMITH & NEPHEW RECORD	
ITEM:	Allevyn Thin IFU (Russian)
CODE:	
THIS BSC:	xxxxxxxx / 46658
PREV BSC:	
DATE:	07/02/2014
REVISION:	02

STRAWBERRY RECORD			
JOB NO:	1542		
DIMS:	90 x 210mm		
COLOURS	■ Black		
Match to coated stock PMS			
ARTWORK	MP	CHECKED	JW



ALLEVYN[®] THIN

Самоклеящаяся повязка из полиуретановой пены

Не использовать повязку из открытой или поврежденной упаковки.

Описание

ALLEVYN Thin – это самоклеящаяся раневая повязка, которая содержит высокоабсорбирующий материал, включенный в полиуретановый матрикс, покрытый водоотталкивающей пленкой.

Механизм действия

Повязка ALLEVYN Thin помогает поддерживать оптимальную для заживления раны влажность. Повязку легко накладывать и удалять. Её гибкость позволяет применять повязку на всех частях тела.

Показания к применению

Повязки ALLEVYN Thin предназначены для лечения поверхностных ран с небольшой или умеренной экссудацией, а так же легкие ожоги и ссадины. Кроме того, повязки ALLEVYN Thin могут использоваться под наблюдением врача для лечения таких ран, как ожоги второй степени, пролежни, венозные трофические язвы, послеоперационные раны и донорские участки при пересадке кожи.

Инструкция по применению

- 1 Очистите рану согласно стандартной процедуре.
- 2 Выберите повязку подходящего размера, чтобы она перекрывала края раны не менее чем на 2 см. Повязку ALLEVYN Thin можно выкраивать для аппликации на раны для частей тела сложного рельефа.
- 3 Подготовьте и очистите кожу вокруг раны путем удаления избыточного экссудата. Удалите волосы вокруг раны, чтобы повязка хорошо прилегла к раневой поверхности.
- 4 Удалите защитную пленку.
- 5 Наложите повязку на рану самоклеящейся стороной, чтобы она хорошо прилегла к раневой поверхности. Повязка ALLEVYN Thin не нуждается в дополнительной фиксации.

Частота смены повязки

Частота смены повязки зависит от количества раневого экссудата. Смените повязку при промокании или увеличении в объеме вторичной повязки. Интервал между сменами повязки обычно составляет от одного до нескольких дней, но не реже одного раза в неделю. В начальных фазах лечения раны ревизия повязки должна производиться чаще.

Удаление повязки

Для удаления повязки ALLEVYN Thin приподнимите ее за один из уголков и затем потяните на себя.

Сочетание с другими методами лечения

ALLEVYN Thin можно использовать в комбинации с другими методами лечения, в частности, с компрессионной терапией под наблюдением специалиста.

Меры предосторожности

Не применяйте повязки ALLEVYN Thin вместе с такими окислителями, как растворы гипохлорита или перекиси водорода. Повязка сохраняет стерильность, пока не нарушена целостность упаковки.

Противопоказания

Не используйте на ранах с открытыми мышцами, костями или сухожилиями, при возникновении риска пересыхания ран. Не применяйте на ранах, окруженных поврежденной или чувствительной кожей. При подозрении на развитие инфекции (гиперемия кожи или гнойный экссудат) проконсультируйтесь с лечащим врачом. Инфицированные раны необходимо ежедневно осматривать и лечить соответствующим образом.

Ассортимент

Код	Размер	Штук в упаковке
66047576	5см x 6см (2" x 2½")	10
66047578	10см x 10см (4" x 4")	5
66000816	10см x 10см (4" x 4")	10
66047579	15см x 20см (6" x 8")	3
66000818	15см x 20см (6" x 8")	10

" - дюймы

СТЕРИЛЬНО R Хранить в сухом месте при температуре не выше <25°C (77°F). Для однократного применения. Для ран с небольшой и умеренной экссудацией. Радиационный метод стерилизации. Внимание! Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Самоклеящаяся повязка. Беречь от солнечных лучей

Производитель

Произведено в Англии для Smith & Nephew Medical Limited, Hull HU3 2BN, Англия.

Торговая марка Smith & Nephew © Smith & Nephew 2013

46658



0086